Ⅲ. 乳がん

★は内服薬　　2026年10月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
EC（60）	エピルビシン塩酸塩	60mg/㎡	点滴静注　15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	600mg/㎡	点滴静注　30分	day1		
EC（75）	エピルビシン塩酸塩	75mg/㎡	点滴静注　15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	600mg/㎡	点滴静注　30分	day1		
EC（90）	エピルビシン塩酸塩	90mg/㎡	点滴静注　15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	600mg/㎡	点滴静注　30分	day1		
FEC（60）	エピルビシン塩酸塩	60mg/㎡	点滴静注　15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	500mg/㎡	点滴静注　30分	day1		
	フルオロウラシル	500mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
FEC（75）	エピルビシン塩酸塩	75mg/㎡	点滴静注　15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	500mg/㎡	点滴静注　30分	day1		
	フルオロウラシル	500mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
FEC（100）	エピルビシン塩酸塩	100mg/㎡	点滴静注　15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	500mg/㎡	点滴静注　30分	day1		
	フルオロウラシル	500mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
DOC（Triweekly）	ドセタキセル	70mg/㎡	点滴静注　1時間	day1	21日	
PTX（Weekly）	パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,8,15	28日	
トラスツズマブ（術後補助化学療法）	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	18コース
トラスツズマブ（Weekly）	トラスツズマブ	初回：4mg/kg 2回目以降：2mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	7日	
トラスツズマブ（Triweekly）	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
トラスツズマブ+DOC（Weekly）	トラスツズマブ	初回：4mg/kg 2回目以降：2mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,8,15	21日	
	ドセタキセル	70mg/㎡	点滴静注　1時間	day8		
トラスツズマブ+DOC（Triweekly）	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
	ドセタキセル	70mg/㎡	点滴静注　1時間	day1		
トラスツズマブ+PTX	トラスツズマブ	初回：4mg/kg 2回目以降：2mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,8,15,22	28日	
	パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注　1時間	day8,15,22		
VNR単剤	ビノレルビン	25mg/㎡	点滴静注　10分以内で	day1,8	21日	
トラスツズマブ+VNR（Weekly）	トラスツズマブ	初回：4mg/kg 2回目以降：2mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,8,15	21日	
	ビノレルビン	25mg/㎡	点滴静注　10分以内で	day1,8		
トラスツズマブ+VNR（Triweekly）	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
	ビノレルビン	25mg/㎡	点滴静注　10分以内で	day1,8		
nab-PTX（Triweekly）	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260mg/㎡	点滴静注　30分	day1	21日	
GEM単剤	ゲムシタビン	1250mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8	21日	
エリブリン単剤	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/㎡	点滴静注　2～5分	day1,8	21日	
TC（DOC+CPA）	ドセタキセル	75mg/㎡	点滴静注　1時間	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	600mg/㎡	点滴静注　30分	day1		
Bmab+PTX	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,15	28日	
	パクリタキセル	90mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,8,15		
ペルツズマブ+トラスツズマブ+Weekly PTX	ペルツズマブ	初回：840mg/body 2回目以降：420mg/body	点滴静注 30～60分	day1	21日	
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1		
	パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,8,15		
ペルツズマブ+トラスツズマブ+DOC	ペルツズマブ	初回：840mg/body 2回目以降：420mg/body	点滴静注 30～60分	day1	21日	術前・術後補助の場合4コース
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1		
	ドセタキセル	75mg/㎡	点滴静注　1時間	day1		
ペルツズマブ+トラスツズマブ	ペルツズマブ	初回：840mg/body 2回目以降：420mg/body	点滴静注 30～60分	day1	21日	術前・術後補助の場合14コース
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1		
トラスツズマブ エムタンシン	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	術後補助の場合14コース

Ⅲ. 乳がん

★は内服薬　　2026年10月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
ペルツズマブ +トラスツズマブ +Cape	ペルツズマブ	初回：840mg/body 2回目以降：420mg/body	点滴静注 30～60分	day1	21日	
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1		
	★カペシタビン	2000mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1（夕） −15（朝）		
CMF	メトトレキサート	40mg/㎡	点滴静注　20分	day1,8	28日	6コース
	フルオロウラシル	600mg/㎡	点滴静注　20分	day1,8		
	★シクロホスファミド	100mg/㎡/day	1日1回　朝食後	day1−14		
dose−dense AC	ドキソルビシン塩酸塩	60mg/㎡	点滴静注　15分	day1	14日	4コース
	シクロホスファミド	600mg/㎡	点滴静注　30分	day1		
dose−dense PTX	パクリタキセル	175mg/㎡	点滴静注　3時間	day1	14日	dose−dense AC 療法4コース後に 4コース施行
CPT−11単剤	イリノテカン 塩酸塩水和物	100mg/㎡	点滴静注　90分	day1,8,15	35日	
IRIS	イリノテカン 塩酸塩水和物	60mg/㎡	点滴静注　90分	day1,8,15	28日	
	★テガフール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフールとして 80mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day3−7 day10−14 day17−21		
アテゾリズマブ+nab−PTX	アテゾリズマブ	840mg/body	点滴静注　1時間	day1,15	28日	
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8,15		
ペルツズマブ +トラスツズマブ +エリブリン	ペルツズマブ	初回：840mg/body 2回目以降：420mg/body	点滴静注 30～60分	day1	21日	
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1		
	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/㎡	点滴静注　2～5分	day1,8		
トラスツズマブ+エリブリン	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/㎡	点滴静注　2～5分	day1,8		
ペルツズマブ +トラスツズマブ +VNR	ペルツズマブ	初回：840mg/body 2回目以降：420mg/body	点滴静注 30～60分	day1	21日	
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1		
	ビノレルビン	25mg/㎡	点滴静注　10分以内で	day1,8		
トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
ペムブロリズマブ +GEM+CBDCA	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注　30分	day1	21日	
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8		
	カルボプラチン	AUC＝2	点滴静注　1時間	day1,8		
m−ペムブロリズマブ+PTX	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注　30分	day1	28日	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞは PTXの投与ｽｹｼﾞｭｰﾙにあわせて4週1回で投与
	パクリタキセル	90mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,8,15		
ペムブロリズマブ +PTX+CBDCA	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注　30分	day1	21日	4コース
	パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,8,15		
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注　1時間	day1		
ペムブロリズマブ+EC	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注　30分	day1	21日	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ +PTX+CBDCA 療法4コース後に 4コース施行
	エピルビシン塩酸塩	90mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	シクロホスファミド	600mg/㎡	点滴静注　30分	day1		
ペムブロリズマブ単剤	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注　30分	day1	21日	9コース
フェスゴ+DOC	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ ボルヒアルロニダーゼ アルファ	初回：IN 15mL/body 2回目以降：MA 10mL/body	皮下注 初回8分以上 2回目以降5分以上	day1	21日	術前・術後 補助の場合 4コース
	ドセタキセル	75mg/㎡	点滴静注　1時間	day1		
フェスゴ単剤	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ ボルヒアルロニダーゼ アルファ	初回：IN 15mL/body 2回目以降：MA 10mL/body	皮下注 初回8分以上 2回目以降5分以上	day1	21日	術前・術後 補助の場合 14コース
フェスゴ+エリブリン	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ ボルヒアルロニダーゼ アルファ	初回：IN 15mL/body 2回目以降：MA 10mL/body	皮下注 初回8分以上 2回目以降5分以上	day1	21日	
	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/㎡	点滴静注　2～5分	day1,8		
フェスゴ+VNR	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ ボルヒアルロニダーゼ アルファ	初回：IN 15mL/body 2回目以降：MA 10mL/body	皮下注 初回8分以上 2回目以降5分以上	day1	21日	
	ビノレルビン	25mg/㎡	点滴静注　10分以内で	day1,8		

Ⅲ. 乳がん

★は内服薬　　2026年10月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
フェスゴ+Cape	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	初回：IN 15mL/body 2回目以降：MA 10mL/body	皮下注 初回8分以上 2回目以降5分以上	day1	21日	
	★カペシタビン	2000mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1（夕） −15（朝）		
フェスゴ+Weekly PTX	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	初回：IN 15mL/body 2回目以降：MA 10mL/body	皮下注 初回8分以上 2回目以降5分以上	day1	21日	
	パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,8,15		
サシツズマブ ゴビテカン	サシツズマブ ゴビテカン	10mg/kg	点滴静注 1～3時間	day1,8	21日	
ダトポタマブ デルクステカン	ダトポタマブ デルクステカン	6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
トラスツズマブ デルクステカン +ペルツズマブ	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
	ペルツズマブ	初回：840mg/body 2回目以降：420mg/body	点滴静注 30～60分	day1		